

1. Koja od sledećih neželjenih dejstava su tipična za aminoglikozide? (2)
 - a) Oštećenje jetre
 - b) Oštećenje bubrega
 - c) Oštećenje oka
 - d) Oštećenje unutrašnjeg uha
 2. Aminoglikozidi se primenjuju (1):
 - a) Oralno i intravenski
 - b) Oralno
 - c) Intravenski
 - d) Lokalno
 3. Inhibitori sinteze proteina su u poređenju sa inhibitorima sinteze ćelijskog zida (1):
 - a) Podjednako toksični za ljude
 - b) Manje toksični za ljude
 - c) Više toksični za ljude
 - d) Nijedno od navedenog
 4. Na biološku raspoloživost tetraciklina utiče (1):
 - a) Čaj
 - b) Kafa
 - c) Meso
 - d) Mlečni proizvodi
 - e) Slatkiši
 5. Tetraciklini se u sistemskom lečenju primenjuju (1):
 - a) Oralno
 - b) Parenteralno
 - c) Oralno i parenteralno
 - d) Nijedno od navedenog
 6. Tetraciklini su (1):
 - a) Bakteriostatici
 - b) Baktericidi
 - c) Bakteriostatici i baktericidi
 - d) Nijedno od navedenog
 7. U trudnoći je dozvoljena primena (1):
 - a) Tetraciklina
 - b) Hinolona
 - c) Makrolida
 - d) Sve navedeno
 8. Iako je hloramfenikol efikasan antibakterijski lek njegova upotreba je ograničena usled (1):
 - a) Male biološke raspoloživosti
 - b) Ozbiljne toksičnosti
 - c) Ograničenog antibakterijskog spektra
 - d) Interakcija sa drugim lekovima
 - e) Interakcija sa hranom
 9. Sindrom sive bebe je neželjeno dejstvo koje se dovodi u vezu sa upotrebom (1):
 - a) Doksiciklina
 - b) Hloramfenikola
 - c) Gentamicina
 - d) Azitromicina
 - e) Linkozamida
 10. U slučaju postojanja alergije na peniciline bezbedna zamena su lekovi iz grupe (1):
 - a) Hinolona
 - b) Tetraciklina
 - c) Piranozida
 - d) Aminoglikozida
 - e) Makrolida
 11. U kojoj generaciji hinolona se nalaze klasični hinoloni (1)
 - a) 1. generacija
 - b) 2. generacija
 - c) 3. generacija
 - d) 4. generacija
 12. Koji od lekova iz grupe sulfonamida pokazuje baktericidni efekat? (1)
 - a) Sulfizoksazol
 - b) Sulfadiazin
 - c) Sulfametoksazol
 - d) Sulfadoksin
 - e) Ko-trimoksazol
 13. Pseudomembranozni kolitis je neželjeno dejstvo koje se najčešće pripisuje (1):
 - a) Aminoglikozidima
 - b) Tetraciklinima
 - c) Piranozidima
 - d) Amfenikolima
 - e) Makrolidima
- Povezati imena lekova sa grupama:
- A. Eritromicin
 - B. Meticilin
 - C. Meropenem
 - D. Amikacin
 - E. Klindamicin
 - F. Minociklin
 - G. Cefamicin
 - H. Hloramfenikol
 - I. Rifampicin
 - J. Vankomicin

14. _____ Aminoglikozidi
15. _____ Makrolidi
16. _____ Tetraciklini
17. _____ Piranozidi
18. _____ Amfenikoli
19. Produženje QT intervala i povećana sklonost ka nastanku aritmija je neželjeno dejstvo koje se pripisuje (1):
- Aminoglikozidima
 - Amfenikolima
 - Makrolidima
 - Hinolonima
 - Tetraciklinima
20. Disulfiramski sindrom i metalni ukus u ustima je neželjeno dejstvo koje se pripisuje (1):
- Gentamicinu
 - Metronidazolu
 - Ciprofloksacinu
 - Doksiciklinu
 - Kotrimoksazolu
21. Delovanje protiv isključivo anaerobnih bakterija je karakteristika (1):
- Sulfonamida
 - Makrolida
 - Amfenikola
 - Nitroimidazola
 - Hinolona
22. Oštećenje želuca češće izazivaju (1):
- Neselektivni COX inhibitori
 - Selektivni COX-2 inhibitori
 - Ne postoji razlika
23. Koji od lekova je kontraindikovano kod pacijenata obolelih od astme (1):
- Paracetamol
 - Acetil-salicilna kiselina(Aspirin)
 - Ibuprofen
 - Nijedan od navedenih
24. Koji od lekova je dozvoljeno koristiti tokom trudnoće (1):
- Paracetamol
 - Acetil-salicilna kiselina(Aspirin)
 - Ibuprofen
 - Nijedan od navedenih
25. Po život opasno neželjeno dejstvo kod primene opijatnih analgetika je:
- Infarkt miokarda
 - Inzult (šlog)
 - Depresija disanja
 - Krvarenje
26. Neželjena dejstva benzodijazepina su:
- Poremećaj motorne koordinacije
 - Depresija disanja
 - Peptički ulkus
 - Pospanost
 - Oštećenje jetre
27. Pri primeni benzodijazepina kod starijih osoba potrebno je terapiju započeti
- sa nižim dozama i postepeno povećavati
 - sa višim dozama i postepeno smanjivati
 - uobičajenim dozama koje se ne menjaju tokom tretmana
 - nijedno od navedenog
28. Kod pacijenata koji pate od anksioznosti opravdana je primena (1):
- Kardiotoničnih glikozida
 - Nitroglicerina
 - Enalapriila
 - Propranolola
 - Diuretika
29. Efekti benzodijazepina su (3):
- Anksiolitički
 - Hipnotički
 - Miorelaksacija
 - Analgezija
30. Kod predoziranja benzodijazepinima koristi se antidot (1):
- diazepam
 - lorazepam
 - morfin
 - flumazenil
 - varfarin